

# PROYECTO DE PROSPECTO/RÓTULO

---

## **ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA**

**IBUPROFENO 400 mg**

Cápsulas blandas

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

### **¿Qué contiene ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA?**

Cada cápsula blanda contiene: como ingrediente activo, 400 miligramos de Ibuprofeno; e ingredientes no activos polietilenglicol 600, hidróxido de potasio 50% P/P, gelatina, sorbitol/sorbitan, colorante amarillo ocaso (CI 159859), tinta blanca para impresión de Ribbon Printing Opacode, triglicéridos de cadena media, lecitina de soja.

### **ACCIONES**

Analgésico (calma el dolor), Antifebril (baja la fiebre) y Antiinflamatorio (reduce la inflamación).

### **¿Para qué se usa ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA?**

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, musculares, articulares, de dientes, menstruales). También alivia los dolores asociados a estados gripales, resfrío común y para bajar la fiebre.

### **¿Qué personas no pueden recibir ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA?**

No use **ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA** cápsulas blandas en caso de:

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto (Si tiene antecedentes de asma o rinitis)
- Si ha padecido reacciones alérgicas severas luego de la ingesta de aspirina u otros antiinflamatorios.
- Tiene o ha tenido úlcera o hemorragia en el estómago, sangrado gastrointestinal o perforación
- Enfermedades inflamatorias intestinales.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 12 años de edad.
- Se encuentra cursando el tercer trimestre de embarazo.

### **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA?**

Debe ser tomada la menor dosis por el periodo de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Este producto no debe ser usado para dolores abdominales.

Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si:

- Es mayor de 65 años
- Tiene problemas circulatorios.
- Si tiene antecedentes de hipertensión arterial.
- Si tiene enfermedades del corazón, riñones o hígado.
- Debe tomar aspirina en bajas dosis para inhibir la agregación plaquetaria.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### **¿Cómo se usa este medicamento?**

Vía de administración oral.

Adultos y mayores de 12 años:

1 cápsula blanda cada 6 u 8 horas. Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 cápsulas blandas de 400 mg (1200 mg/día). Para pacientes con sensibilidad estomacal, se recomienda tomar preferentemente después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 / 72 horas consulte a su médico. **No usar en niños menores de 12 años.**

### **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando ACTRON® RÁPIDA ACCIÓN NUEVA FÓRMULA?**

Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:

- Experimenta alergias y reacciones en la piel, como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de asma.
- Experimenta toxicidad gastrointestinal, sangrado o ulceración.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto o experimenta cualquier otra reacción, consulte a su médico y suspenda su uso.

### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez TE: (011)4962-6666 ó 4962-2247.
- Hospital A Posadas TE: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 25° C. No almacenar en heladera. Proteger de la luz solar directa.

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Fabricado en Av. Márquez 691, Loma Hermosa, Pcia. de Buenos Aires y acondicionado en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, Pcia. de Buenos Aires; por **BAYER S.A.**, Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° XXXX

Vencimiento:

Lote N°:

Fecha de última revisión:

Versión: CCDS 02

Presentaciones: Envases con 1, 2, 4, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 500 o 1000 cápsulas blandas, siendo las últimas dos para uso exclusivo hospitalario.